

相談内容（一部だけ紹介します。）

- ①①自身のホルモン治療について(現在はタモキシフェンを服用中。リュープリンやゾデラックスの皮下注射は必要かどうか)
②今後の検査スケジュールや検査の内容について
追記 2020年10月に左乳房全摘出及びリンパ郭清手術レベル2 同年12月よりEC、ドセタキセル、ハーセプチンパージェタ 放射線治療済み⇒新しく入会した会員さんです。

- ②H17 左胸全摘、ステージⅡB、ホルモン療法5年間、抗HER2 +化学療法
H21 右胸温存手術、トリプルネガティブタイプで、化学療法、放射線治療後
定期的に年一回の血液検査とPETをしていました。
H29も6月にPET異常なしでしたが、10月に、残っている右胸にしこりを自覚し、
組織検査の結果 同じトリプルネガティブタイプで
12月に右胸全摘し、化学療法をH30年5月に終了後、定期検査が、血液検査と、
PETではなく、CT撮影(64列以上マルチスライス型機器)になりましたが、何故なの
のでしょうか？
自己検診としては、今後どのあたりを気をつけていけばいいですか？
以上です。よろしく願います ⇒3年前に再発した方です。

- ③抗がん剤治療中の浮腫みについて相談です。
抗がん剤を点滴するたびに、身体全体に浮腫みが出てしまい、体重増加に繋がってしま
っています。
何か良い方法で浮腫み軽減できる方法はありませんか？⇒再発を何度も経験して治療さ
れている方です。

- ④初発はホルモン受容体 陽性、HER2 受容体陰性で右側温存手術、2回目はトリプルネ
ガティブで右側全摘手術となりました。もし、今後、左側にも乳ガンができてしまうよ
うなことがあれば、またタイプが変わる事はあるのでしょうか？
・現在、ゼローダを服用しています。まだまだコロナ感染者が多くて、いつ感染してもお
かしくありません。もし、発熱や喉の痛みなど感染が疑わしい症状が出たら、服用は続
けてもいいのでしょうか？
コロナ症状が高熱などの強い場合と軽い場合、ゼローダ副作用症状の強い場合と軽い場
合で教えてください。⇒15年経ち再発し、昨年末手術された方です。